

Окраска по Граму

Применение окраски

1. Из физиологической среды вымыть микробные клетки, в которой может быть и патогенная бактерия, и добавить в среду 0,5% раствор метиленового синего (1:100) и встряхнуть 2 мин.
2. Слить жидкую среду, а из оставшейся среды высушить микробы на предметном стекле и обработать их раствором кристаллического фиолетового (1:100) в течение 1 мин.
3. Слить раствор фиолетового и обработать оставшиеся микробы раствором 1% раствора уксусной кислоты в течение 1 мин.
4. Промыть микробы чистой водой и обработать их раствором 1% раствора йода в течение 1 мин.
5. Слить раствор йода и обработать микробы раствором 1% раствора щелочной калийной перманганатной кислоты в течение 1 мин.
6. Промыть микробы чистой водой и обработать их раствором 1% раствора щелочной калийной перманганатной кислоты в течение 1 мин.



Окраска по Граму
используется для определения
чувствительности микробов
к антибиотикам.

Методика окраски по Граму
используется для определения
чувствительности микробов
к антибиотикам.



ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

СЕТЬ 230В

- ВК1 ВК5
- ВК2 ВК6
- ВК3 ВК7
- ВК4







